

VOERMOL SKAAPAFRONDKORRELS

Klas: Skaapafondvoer

VOERMOL SKAAPAFRONDKORRELS is 'n volledige voer vir die voerkraalafroning van lammers:

- bevat die nodige minerale, spoorminerale asook Vitamien A vir optimale produksie;
- bevat 'n ionofoor en ander medikamente om prestasie en doeltreffendheid te verbeter.

**SAMESTELLING VAN VOERMOL SKAAPAFRONDKORRELS**

REG NR V12796 (Wet 36/1947)

		(g/kg)	(mg/kg)
Ruproteïen*	(min)	140	Mangaan 40
Ureum	(maks)	10	Koper 9
Ruvesel	(maks)	150	Kobalt 0.15
Vog	(maks)	120	Yster 75
Vet	(min/maks)	25/75	Jodium 0.6
Kalsium	(maks)	10	Sink 50
Fosfor	(min)	3	Selenium 0.16
			Vitamien A (IE/kg) 4 000
			Energie beraam (MJ ME/kg) 10.2
*28.1 % afkomstig vanaf NPN			Bevat medikamente

Verpakking – 50 kg

Sien ureumwaarskuwing

L.W. Bevat medikamente en moet dus nie aan perde gevoer word nie.

MEDIKAMENTE WAARSKUWING: Hierdie produk bevat geregistreerde medikamente. Voer streng volgens neergelegde gebruiksaanwysings.

VOEDINGSINSTRUKSIES

Voermol Skaapafrondkorrels is 'n volledige voer en moet *ad lib.* gevoer word. Voer addisionele hooi tydens die eerste sowat 14 dae van aanpassing.

In oorleg met die veearts, volg 'n volledige doserings- en inentingsprogram, insluitend teen *Klostridium spp.*



UREUMWAARSKUWING

UREUM

Die meeste lekke bevat ureum wat onder sekere omstandighede gevare inhou. Tydens die formulering en vervaardiging van **Voermol-lekke** word daar gepoog om die risiko van ureumvoeding so laag as moontlik te hou. Die voorkoms van ureumvergiftiging kan verder verlaag word deur op die volgende te let:

- gebruik lekke volgens voorskrif;
- beperk lekinname tot die voorgeskrewe maksimum vlak;
- voer lekke saam met voldoende weiding en/of ruvoer;
- tref spesiale voorsorg tydens voerskaarste (droogtetoestande) om hoë lekinname te voorkom;
- voorkom die oormatige aanvanklike lekinname (southonger) deur diere, vir die eerste 14 dae, toegang tot **Voermol Rumevite 6P** te gee;
- moenie dat die lek nat reën nie.

Sien ureumwaarskuwing agter op sak.

UREUMWAARSKUWING

Hierdie veevoedsel bevat NPN-(Nie-Proteïen Stikstof) bronne en moet daarom streng volgens die gebruiksaanwysings vermeng en gevoer word.

- Asyn is 'n doeltreffende middel teen NPN-vergiftiging. Meng met gelyke hoeveelheid water en doseer 'n halwe bottel per kalf/skaap en 2 – 4 bottels per bees (1 bottel = 750 ml).
- Beskerm hierdie veevoedsel teen reën. NPN is oplosbaar en diere wat so 'n oplossing drink kan vergiftig word.
- Moet nie die veevoedsel onoordeelkundig saam met ander NPN-bevattende veevoedsels voer nie. Raadpleeg 'n veekundige.
- Dit is 'n aanvulling en nie 'n volledige voer nie. Voldoende weiding en/of ruvoer moet ten alle tye beskikbaar wees.
- Meng hierdie konsentraat deeglik met die voorgeskrewe bestanddele.
- Hou lekbakke vol en verhoed dat honger diere hul oorvreet. 'n Konstante daaglikse voerinname voorkom vergiftiging.
- Voordat 'n NPN-bevattende lek gevoer word, moet 'n gewone sout/fosfaatlek vir minstens 7 dae gevoer word.

GMO OPMERKING

Hierdie dierevoedsel mag grondstowwe bevat wat van GMO (geneties gemodifiseerde organismes) oorsprong is.

