

VOERMOL LANDELEK

Klas: Proteïen- en Spoormineraalaanvulling vir Herkouers

VOERMOL LANDELEK is ontwikkel om voedingstekorte en voedingsprobleme op oesreste van somergrane en stoppellande van wintergrane te beperk. **Voermol Landelek** is 'n proteïen-spoormineraal aanvulling vir skape, beeste en bokke:

- is klaargemeng en kan net so gebruik word;
- bevat verskillende buffers om suurpens (asidose) te voorkom;
- bevat 'n anioonsout om blaassteenvorming te beperk;
- bevat 'n medium inhoud verbyvloeiproteïen en ten minste 32.7 % van die proteïen is afkomstig van natuurlike proteïenbronne;
- bevat voldoende hoeveelhede van al sewe noodsaaklike spoorelemente;
- is melassegebaseer wat smaaklik is en 'n goeie inname verseker;
- die lek sal nie wegwaai nie.



SAMESTELLING VAN VOERMOL LANDELEK			
REG NR V15414 (Wet 36/1947)			
		(g/kg)	(mg/kg)
Ruproteïen*	(min)	260	Mangaan 160
Ureum	(maks)	61	Koper 30
Ruvesel	(maks)	100	Kobalt 0.5
Vog	(maks)	160	Yster 150
Vet	(min)	25	Jodium 2.5
			Sink 200
			Selenium 0.5
			Vitamien A (IE/kg) 15 000
*67.3 % afkomstig vanaf NPN		Bevat medikamente	

Verpakking – 50 kg

Sien ureumwaarskuwing

GEBRUIKE VAN VOERMOL LANDELEK:

- **Voermol Landelek** word aanbeveel vir jong groeiende diere soos speenkalwers en speenlammers en ook vir koeie met kalwers en ooie met lammers;
- dit word aanbeveel op oesreste van mielies, graansorghum, sonneblomme en stoppellande van kleingrane;
- kan ook met groot sukses op weimielies gebruik word om lammers mee af te rond of vir lammerooie op weimielies.



VOERMOL

VOEDINGSINSTRUKSIES

Om suurpens te beperk, moet skape ten minste 14 dae voordat hulle op die oesreste of weimielies gaan, vrye toegang tot **Voermol Landelek** hê. Voer ook mielies of mieliekoppe daaglik op die veld en vermeerder geleidelik oor die 14 dae soos volg:

VOEDINGSINSTRUKSIES

Dag	Mielies (g/skaap/dag)
1 – 2	200
3 – 4	300
5 – 6	400
7 – 8	500
9 – 10	600
11 – 12	700
13 – 14	800
15	Jaag skape op lande

Beperkte weityd kan ook toegepas word, maar dit is nie so doeltreffend soos bogenoemde metode nie.

Gebruik die volgende riglyne om weityd te beperk:

Dag	Tyd/dag
1 – 2	15 min
3 – 4	30 min
5 – 6	45 min
7 – 8	60 min
9 – 10	1 hr 15 min
11 – 12	1 hr 30 min
13 – 14	1 hr 45 min
15	Wei permanent

Voermol Landelek moet deurgaans *ad lib.* beskikbaar wees tydens aanpassing en op die land daarna.

AANBEVOLE INNAME	(g/dier/dag)
Beeste:	800 – 1200
Skape:	150 – 200

L.W. Voermol Landelek en bogenoemde bestuursmaatreëls sal die risiko van suurpens drasties verlaag. Aangesien enkele diere in 'n trop baie min of geen lek vreet nie, is dit nie moontlik om te waarborg dat geen suurpens sal voorkom nie.

Bevat medikamente en moet dus nie aan perde gevoer word nie.



VOERMOL

UREUMWAARSKUWING

UREUM

Die meeste lekke bevat ureum wat onder sekere omstandighede gevare inhou. Tydens die formulering en vervaardiging van **Voermol-lekke** word daar gepoog om die risiko van ureumvoeding so laag as moontlik te hou. Die voorkoms van ureumvergiftiging kan verder verlaag word deur op die volgende te let:

- gebruik lekke volgens voorskrif;
- beperk lekinname tot die voorgeskrewe maksimum vlak;
- voer lekke saam met voldoende weiding en/of ruvoer;
- tref spesiale voorsorg tydens voerskaarste (droogtetoestande) om hoë lekinname te voorkom;
- voorkom die oormatige aanvanklike lekinname (southonger) deur diere, vir die eerste 14 dae, toegang tot **Voermol Rumevite 6P** te gee;
- moenie dat die lek natreën nie.

Sien ureumwaarskuwing agter op sak.

UREUMWAARSKUWING

Hierdie veevoedsel bevat NPN-(Nie-Proteïen Stikstof) bronne en moet daarom streng volgens die gebruiksaanwysings vermeng en gevoer word.

- Asyn is 'n doeltreffende middel teen NPN-vergiftiging. Meng met gelyke hoeveelheid water en doseer 'n halwe bottel per kalf/skaap en 2 – 4 bottels per bees (1 bottel = 750 ml).
- Beskerm hierdie veevoedsel teen reën. NPN is oplosbaar en diere wat so 'n oplossing drink kan vergiftig word.
- Moet nie die veevoedsel onoordeelkundig saam met ander NPN-bevattende veevoedsels voer nie. Raadpleeg 'n veekundige.
- Meng hierdie konsentraat deeglik met die voorgeskrewe bestanddele.
- Hou lekbakke vol en verhoed dat honger diere hul oorvreet. 'n Konstante daaglikse voerinnamte voorkom vergiftiging.
- Voordat 'n NPN-bevattende lek gevoer word, moet 'n gewone sout/fosfaatlek vir minstens 7 dae gevoer word.

GMO OPMERKING

Hierdie dierevoedsel mag grondstowwe bevat wat van GMO (geneties gemodifiseerde organismes) oorsprong is.



VOERMOL