

# VOERMOL LANDELEK

Klas: Proteïen- en Spoormineraalaanvulling vir Herkouers

**VOERMOL LANDELEK** is 'n klaargemengde lek ontwikkel vir die voorkoming van suurpens (asidose) en aanvulling van voedingstekorte op somergraan- en wintergraanoesreste asook weimielies:

- bevat verskillende buffers om suurpens (asidose) te voorkom;
- bevat 'n anioonsout om blaassteenvorming te beperk;
- bevat medikamente wat doeltreffendheid van energie benutting verbeter, groei versnel, voeromsetverhouding verbeter, en help met die voorkoming van koksidiöse;
- bevat 'n medium inhoud deurvloei proteïen en ten minste 32.7 % van die proteïen is afkomstig van natuurlike proteïenbronne;
- bevat voldoende hoeveelhede van al sewe noodsaaklike spoorminerale;
- is melassegebaseer wat smaaklik is en 'n goeie inname verseker; die lek sal nie wegwaai nie.



## SAMESTELLING VAN VOERMOL LANDELEK

REG NR V15414 (Wet 36/1947)

		(g/kg)	(mg/kg)
Ruproteïen*	(min)	260	Mangaan 160
Ureum	(maks)	61	Koper 30
Ruvesel	(maks)	100	Kobalt 0.5
Vog	(maks)	160	Yster 150
			Jodium 2.5
			Sink 200
			Selenium 0.5
			Vitamiën A (IE/kg) 15 000
*67.3 % afkomstig vanaf NPN			Bevat medikamente

Verpakking – 50 kg

Sien ureumwaarskuwing

***L.W. Bevat medikamente en moet dus nie aan perde gevoer word nie. Moet nie ongemeng voer nie.***

***MEDIKAMENTE WAARSKUWING: Hierdie produk bevat geregistreerde medikamente. Voer streng volgens neergelegde gebruiksaanwysings.***

### GEBRUIKE VAN VOERMOL LANDELEK:

- **Voermol Landelek** word aanbeveel vir jong groeiende diere soos speenkalwers en speenlammers en ook vir koeie met kalwers en ooeie met lammers;
- dit word aanbeveel op oesreste van mielies, graansorghum, sonneblomme en stoppellande van kleingrane;
- kan ook met groot sukses op weimielies gebruik word om lammers mee af te rond of vir lammerooie op weimielies.



## VOEDINGSINSTRUKSIES VIR AANPASSING

Om suurspens te beperk, moet skape ten minste 14 dae voordat hulle op die oesreste of weimielies gaan, vrye toegang tot **Voermol Landelek** hê. Voer ook mielies of mieliekoppe daaglik op die veld en vermeerder geleidelik oor die 14 dae soos volg. In oorleg met 'n veearts, volg 'n doseer- en inentingsprogram, insluitend van *Klostridium spp.* veral vir skape en bokke:

## VOEDINGSINSTRUKSIES VIR AANPASSING

Dag	Mielies (g/skaap/dag)
1 – 2	200
3 – 4	300
5 – 6	400
7 – 8	500
9 – 10	600
11 – 12	700
13 – 14	800
15	Jaag skape op lande

Beperkte weityd kan ook toegepas word, maar dit is nie so doeltreffend soos bogenoemde metode nie.

Gebruik die volgende riglyne om weityd te beperk:

Dag	Tyd/dag
1 – 2	15 min
3 – 4	30 min
5 – 6	45 min
7 – 8	60 min
9 – 10	1 hr 15 min
11 – 12	1 hr 30 min
13 – 14	1 hr 45 min
15	Wei permanent

**Voermol Landelek** moet te alle tye beskikbaar wees.

AANBEVOLE INNAME	(g/dier/dag)
Beeste:	800 – 1200
Skape:	150 – 200

***L.W.Voermol Landelek in samewerking met bogenoemde bestuursbeginsels sal die risiko van suurspens drasties verminder. Aangesien sekere diere in 'n trop soms min of geen lek vreet, kan dit nie gewaarborg word dat suurspens nie sal voorkom nie.***



## UREUM

Die meeste lekke bevat ureum wat onder sekere omstandighede gevare inhou. Tydens die formulering en vervaardiging van **Voermol-lekke** word daar gepoog om die risiko van ureumvoeding so laag as moontlik te hou. Die voorkoms van ureumvergiftiging kan verder verlaag word deur op die volgende te let:

- gebruik lekke volgens voorskrif;
- beperk lekinname tot die voorgeskrewe maksimum vlak;
- voer lekke saam met voldoende weiding en/of ruvoer;
- tref spesiale voorsorg tydens voerskaarste (droogtetoestande) om hoë lekinname te voorkom;
- voorkom die oormatige aanvanklike lekinname (southonger) deur diere, vir die eerste 14 dae, toegang tot **Voermol Rumevite 6P** te gee;
- moenie dat die lek nat reën nie.

### Sien ureumwaarskuwing agter op sak.

## UREUMWAARSKUWING

Hierdie veevoedsel bevat NPN-(Nie-Proteïen Stikstof) bronne en moet daarom streng volgens die gebruiksaanwysings vermeng en gevoer word.

- Asyn is 'n doeltreffende middel teen NPN-vergiftiging. Meng met gelyke hoeveelheid water en doseer 'n halwe bottel per kalf/skaap en 2 – 4 bottels per bees (1 bottel = 750 ml).
- Beskerm hierdie veevoedsel teen reën. NPN is oplosbaar en diere wat so 'n oplossing drink kan vergiftig word.
- Moet nie die veevoedsel onoordeelkundig saam met ander NPN-bevattende veevoedsels voer nie. Raadpleeg 'n veekundige.
- Dit is 'n aanvulling en nie 'n volledige voer nie. Voldoende weiding en/of ruvoer moet ten alle tye beskikbaar wees.
- Meng hierdie konsentraat deeglik met die voorgeskrewe bestanddele.
- Hou lekbakke vol en verhoed dat honger diere hul oorvreet. 'n Konstante daaglikse voerinname voorkom vergiftiging.
- Voordat 'n NPN-bevattende lek gevoer word, moet 'n gewone sout/fosfaatlek vir minstens 7 dae gevoer word.

## GMO OPMERKING

Hierdie dierevoedsel mag grondstowwe bevat wat van GMO (geneties gemodifiseerde organismes) oorsprong is.

